

1100-1BO15, rok akademicki 2018/19


OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

dr hab. Rafał Kasztelanic


Wykład 2

Światło a materia - dyspersja

- szybkość propagacji światła w materii zależy od częstotliwości padającej fali
- **współczynnik załamania zależy od długości fali światła $n(\lambda)$**
- Jest to **dyspersja chromatyczna**, jest ona m.in. odpowiedzialna za powstawanie tęczy, czy rozmycie impulsów w światłowodach



[en.wikipedia.org/wiki/Dispersion_\(optics\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(optics))



mathscinotes.com



$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (\text{Cauchy})$$

$$n(\lambda) = n_0 + \frac{A}{(\lambda - \lambda_0)^{1,2}} \quad (\text{Hartmann})$$

$$n^2(\lambda) - 1 = \frac{B_1 \lambda^2}{\lambda^2 - C_1} + \frac{B_2 \lambda^2}{\lambda^2 - C_2} + \frac{B_3 \lambda^2}{\lambda^2 - C_3} \quad (\text{Sellmeier})$$

Światło a materia - dyspersja

Dyspersja powietrza vs. szkła



- Dyspersja chromatyczna jest powszechna
- Dla fal widzialnych przebiega w podobny sposób dla wielu materiałów (współczynnik załamania światła w materiale zmniejsza się wraz ze wzrostem długości fali padającego światła)

Światło a materia - dyspersja

- współczynnik dyspersji

$$\Delta n = n_F - n_C$$

- liczba Abbego (dyspersja względna)

$$v = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C}$$


- dyspersja cząstkowa

$$P_\lambda = \frac{n_F - n_\lambda}{n_F - n_C}$$

$$\lambda_F = 486,1 \text{ nm}$$

$$\lambda_C = 656,3 \text{ nm}$$

$$\lambda_d = 589,3 \text{ nm}$$




Rys. 1.8. Krzywe dyspersji dla niektórych materiałów optycznych

Światło a materia - dyspersja

Liczba Abbego - im jest większa, tym dyspersja materiału jest mniejsza

$$V = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C}$$



Światło a materia - dyspersja


Skąd się wzięły λ_F , λ_C , λ_d itp.?

- Dostępne w dawnych latach lampy gazowe emitowały światło o liniach widmowych zależnych od cech gazu.

| λ [nm] | Symbol linii | Źródło światła | Zakres widmowy |
|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 365.01 | i | Hg | UV |
| 404.66 | h | Hg | violet |
| 435.84 | g | Hg | blue |
| 479.99 | F' | Cd | blue |
| 486.13 | F | H | blue |
| 546.07 | e | Hg | green |
| 587.56 | d | He | yellow |
| 589.3 | D | Na | yellow |
| 643.85 | C' | Cd | red |
| 656.27 | C | H | red |
| 706.52 | r | He | red |
| 768.2 | A' | K | red |
| 852.11 | s | Cs | IR |
| 1013.98 | t | Hg | IR |

Światło a materia - metale

- przewodnik prądu
- współczynnik załamania zespolony
- częstość plazmowa
- odbijanie, pochłanianie
 - dla częstości większych od częstości plazmowej materiał jest przezroczysty
 - dla częstości mniejszych wykazuje duży współczynnik odbicia
 - dla jeszcze mniejszych częstości współczynnik odbicia maleje, ale transmisja nie rośnie, gdyż rośnie absorpcja.
 - występowanie kolejno obszarów o dużej transmisji, odbiciu i absorpcji, jest charakterystyczne dla materiałów przewodzących takich jak metale czy półprzewodniki



kopalniawiedzy.pl

Światło a materia - rozpraszanie

- zjawisko oddziaływania światła z materią, w wyniku którego następuje zmiana kierunku rozchodzenia się światła, inne (zjawisko) niż odbicie i załamanie światła
- rozpraszanie światła może być sprężyste - bez zmiany energii/częstotliwości
- lub niesprężyste - ze zmianą energii/częstotliwości
- wielkość rozproszenia zależy od długości fali elektromagnetycznej, od wielkości cząsteczek atmosfery oraz od długości drogi oddziaływania fali z atmosferą

Przyczyny

- niejednorodnościami układu, w którym zachodzi propagacja fal (cząsteczki substancji, pyły, aerozole, zmiany gęstości itp.).
- nierówność powierzchni

Światło a materia - rozpraszanie

Wyróżniamy trzy rodzaje rozproszenia:


- **rozpraszanie Rayleigha**

Zachodzi gdy wielkość cząsteczek, na których zachodzi rozproszenie jest dużo mniejsza niż długość fali elektromagnetycznej

Zachodzi we wszystkich kierunkach, bez zmiany długości fali

Wynikiem tego rozpraszania jest niebieski kolor nieba i pochłanianie UV przez ozon

$$I \sim \frac{1}{\lambda^4}$$




- **rozpraszanie Mie**

Zachodzi gdy wielkość cząsteczek, na których zachodzi rozproszenie jest porównywalna z długością fali elektromagnetycznej

Najsilniejsze jest w kierunku zgodnym z falą padającą

Nie zależy od długości fali

Rozproszenie przede wszystkim na pyłkach, dymie, zanieczyszczeniach i parze



- **rozpraszanie nieselekcyjne**


Zachodzi gdy wielkość cząsteczek, na których zachodzi rozproszenie jest dużo większa od długości fali elektromagnetycznej.

Rozproszenie przede wszystkim na kropłach wody i dużych cząsteczkach zanieczyszczeń

Rozproszenie nie selektywne jest przyczyną tego, że chmury i mgła są białe.

Ponieważ wszystkie długości światła widzialnego rozpraszane są w podobny sposób

rozpraszanie na szorstkiej powierzchni




Absorpcja (pochłanianie) fali elektromagnetycznej w ośrodku

Cząsteczki gazów, zanieczyszczeń i wody w atmosferze wpływają na energię fali elektromagnetycznej. Jeżeli zachodzi osłabienie mocy promieniowania przy zachowaniu kierunku rozchodzenia fali mówimy o absorpcji.

Mechanizm: foton o energii $E = hv$ może oddziaływać z elektronem walencyjnym w atomie lub molekule wewnątrz ośrodka materialnego.


- Jeżeli energia fotonu jest równa różnicy energii pomiędzy dowolnym stanem wzbudzonym elektronu a stanem podstawowym, wówczas foton zostanie pochłonięty.
- Gdy energia fotonu „nie pasuje” do żadnej różnicy energii stanów, wówczas foton albo przechodzi przez ośrodek materialny bez przeszkód albo jest rozpraszany.
- W wyniku absorpcji fotonu atom lub molekula przechodzi w stan wzbudzony o wyższej energii.
- Wzbudzone atomy lub molekuly wracają do stanu podstawowego emitując jednocześnie foton o takiej samej lub mniejszej energii.

Światło a materia - pochłanianie




Światło a materia - pochłanianie

Przykład: widmo emisyjne & widmo absorpcyjne



Światło a materia - pochłanianie


Przykład: absorpcja światła w wodzie






Zasada Huygensa

- Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali kulistej.



CBSE Class 12 Physics, Wave Optics – 1




www.slideshare.net

Propagacja światła




Zasada Huygensa

- Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali kulistej.





CBSE Class 12 Physics, Wave Optics – 1




www.slideshare.net

- Fale te (fale cząstkowe) interferują ze sobą, tworząc wypadkową powierzchnię falową






Zasada Huygensa




Propagacja światła

Zasada Huygensa





Zasada Fermata




www.quora.com

Promień świetlny poruszając się między dwoma punktami przebywa najkrótszą możliwie drogę optyczną, czyli taką, na której przebycie potrzebuje minimalnego czasu.


Powstawanie cienia

punktowe źródło światła




Powstawanie cienia

punktowe źródło światła




rozciągnięte źródło światła




Propagacja światła


Optyka promieni – ray tracing



sites.google.com/site/tiffanycinglis/fun-stuff/cs-girls-ray-tracing-workshop



pl.wikipedia.org



www.zemax.com


Optyka promieni

- Promień — linia wskazująca kierunek rozchodzenia się energii promieniowania, prostopadła do *powierzchni falowej*
- Wiele zjawisk optycznych nie wymaga analizy światła jako fali elektromagnetycznej i do ich opisu wystarcza operowanie pojęciem promienia świetlnego, który jest odbijany lub załamany na różnych powierzchniach
- W optyce geometrycznej zwykle zaniedbujemy zjawiska pochłaniania fali
- Zakładamy, że *długość fali e-m jest bardzo mała w porównaniu z rozmiarami elementów* tworzących analizowany układ optyczny
- *Wiązka światła* jest obiektem rzeczywistym. Analiza propagacji wiązki polega na analizie biegu promieni ją tworzących
- *Pęk promieni* — wiązka promieni wychodząca (przechodząca) z jednego punktu
- Droga optyczna $L = n \cdot \text{droga geometryczna}$

$$L = \int n ds \quad \text{równanie eikonatu}$$


Załamanie i odbicie światła

Promień padający i promień odbity/załamany leżą w jednej płaszczyźnie




Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła – z zasady Huygensa



E. R. Huggins, Physics 2000, Geometrical Optics




$$i = \angle CAC'' = \angle AC''A'' = i'$$

Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła – z zasady Fermata

Spośród wielu możliwych dróg, światło biegnie po takiej, aby czas poruszania się po niej był ekstremalny (zwykle najkrótszy)



J. Nowak, M. Zajac, Optyka kurs elementarny

$$\delta L = \delta \int_A^B n ds = 0$$

$$L = n \left(\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + (d-x)^2} \right)$$

$$\frac{dL}{dx} = n \left[\frac{1}{2\sqrt{a^2 + x^2}} 2x + \frac{1}{2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} 2(d-x)(-1) \right] = 0$$



$$\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{d-x}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

$$\sin(i_1) = \sin(i_2)$$

$$i_1 = i_2$$




Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła



Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła



góra-dół

Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła





góra – dół

lewo – prawo

przód – tył

Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła – corner reflector




en.wikipedia.org/wiki/Corner_reflector



Załamanie i odbicie światła

Światło na granicy ośrodków





icecube.wisc.edu

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c/n_1}{c/n_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Załamania i odbicie światła

Załamania światła – z zasady Huygensa



$$\lambda_1 = \overline{AB} \sin(\theta_1) = \frac{\lambda_0}{n_1}$$
$$\lambda_2 = \overline{AB} \sin(\theta_2) = \frac{\lambda_0}{n_2}$$


Prawo Snella

$$\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

Załamanie i odbicie światła

Załamanie światła – z zasady Fermata



J. Nowak, M. Zajęc, *Optyka kurs elementarny*

$$S = vt \rightarrow t = \frac{S}{v}$$

$$t = \frac{\sqrt{h^2 + x^2}}{v} + \frac{\sqrt{d^2 + (s-x)^2}}{v'}$$
$$t = \frac{n\sqrt{h^2 + x^2} + n'\sqrt{d^2 + (s-x)^2}}{c}$$

$$\frac{dt}{dx} = 0$$

$$\frac{nx}{\sqrt{h^2 + x^2}} - \frac{n'(s-x)}{\sqrt{d^2 + (s-x)^2}} = 0$$

$$\sin(i) = \frac{x}{\sqrt{h^2 + x^2}}; \quad \sin(i') = \frac{(s-x)}{\sqrt{d^2 + (s-x)^2}}$$



Prawo Snella

$$\frac{\sin(i)}{\sin(i')} = \frac{n'}{n}$$

$$n \sin(i) = n' \sin(i')$$

Załamanie i odbicie światła

Załamanie światła – metoda Younga



Prawo Snella

$$\frac{\sin(i)}{\sin(i')} = \frac{AB/AR'}{AB/AR} = \frac{AR}{AR'} = \frac{n_g}{1} = n_g$$

Optyka geometryczna - aksjomaty

- Światło w ośrodku jednorodnym propaguje się po liniach prostych – promieniach
- Bezwzględny współczynnik załamania $n = \frac{c}{v}$, gdzie v – prędkość światła w danym ośrodku
- Gdy promień przechodzi z ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n_1 do ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n_2 to ulega załamaniu:
 - Promień padający i promień załamany leżą w jednej płaszczyźnie
 - Spełnione jest prawo Snella: $n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta)$
- Przy odbiciu obowiązuje prawo odbicia:
 - Promień padający i promień odbity leżą w jednej płaszczyźnie
 - Kąt odbicia równy jest kątowi padania: $\alpha = \beta$

Załamanie i odbicie światła

Optyka geometryczna - aksjomaty


- Światło w ośrodku jednorodnym propaguje się po liniach prostych – promieniach
- Bezwzględny współczynnik załamania $n = \frac{c}{v}$, gdzie v – prędkość światła w danym ośrodku
- Gdy promień przechodzi z ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n_1 do ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n_2 to ulega załamaniu:
 - Promień padający i promień załamany leżą w jednej płaszczyźnie
 - Spełnione jest prawo Snella: $n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta)$
- Przy odbiciu obowiązuje prawo odbicia:
 - Promień padający i promień odbity leżą w jednej płaszczyźnie
 - Kąt odbicia równy jest kątowi padania: $\alpha = \beta$

Optyka geometryczna – ograniczenia

- Brak zależności od długości fali – dyspersja
- Z promieniem nie jest związana moc światła – podział mocy na granicy ośrodków
- Nie wyjaśnia zjawisk dyfrakcji, interferencji, polaryzacji

Całkowite wewnętrzne odbicie (TIR)

- Przy przechodzeniu światła z ośrodka o większym n_1 do ośrodka o mniejszym n_2 , może nastąpić sytuacja, gdy kąt załamania jest równy lub większy niż 90° , co znaczy, że światło nie może przedostać się przez granicę ośrodków.
- Zjawisko to nazywa się **całkowitym wewnętrznym odbiciem** i jest powszechne w przyrodzie oraz szeroko wykorzystywane w technice.
- TIR (ang. *Total Internal Reflection*)



$$\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin(\theta_2) = \frac{n_1}{n_2} \sin(\theta_1) > 1$$


Promień 4 – kąt graniczny

Załamanie i odbicie światła


Całkowite wewnętrzne odbicie (TIR)



blogs.cisco.com




www.askitians.com




sethsandler.com

Załamanie i odbicie światła


Całkowite wewnętrzne odbicie (TIR)



E. R. Huggins, Physics 2000, Geometrical Optics



esfsciencenew.wordpress.com




www.nilvalls.com




www.tapeciarnia.pl

Załamanie i odbicie światła


Całkowite wewnętrzne odbicie (TIR)




E. R. Huggins, Physics 2000, Geometrical Optics



connect.collins.co.uk





intl.siyavula.com




steemit.com

Propagacja światła w ośrodku niejednorodnym

GRIN – GRAdient INdex optics



www.osapublishing.org





www.scienceabc.com

Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła na granicy ośrodków – wzory Fresnela

- Wzory Fresnela wskazują, jaka część energii padającej fali światła jest odbita na granicy ośrodków o różnym współczynniku załamania.
- Współczynniki odbicia R_s i R_p zależą od polaryzacji światła.



$$R_s = \left[\frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_t + \theta_i)} \right]^2 = \left(\frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \right)^2 = \left[\frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i \right)^2}}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i \right)^2}} \right]^2$$

$$R_p = \left[\frac{\tan(\theta_t - \theta_i)}{\tan(\theta_t + \theta_i)} \right]^2 = \left(\frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i} \right)^2 = \left[\frac{n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i \right)^2} - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i \right)^2} + n_2 \cos \theta_i} \right]^2$$

Odbicie światła na granicy ośrodków – wzory Fresnela dla małych kątów

- Łatwo zauważyć, że dla małych kątów różnica współczynnika odbicia dla różnych polaryzacji staje się mała, czyli obie polaryzacje są odbijane niemal jednakowo.
- Im większa różnica współczynników załamania, tym większe odbicie.

$$R = \left[\frac{(n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)} \right]^2$$



$$\left. \begin{array}{l} n_1 = 1.0 \\ n_2 = 1.5 \end{array} \right\} \rightarrow R = 0,04$$

$$\left. \begin{array}{l} n_1 = 1.0 \\ n_2 = 1.9 \end{array} \right\} \rightarrow R = 0,096 \approx 10\%$$


Załamanie i odbicie światła

Odbicie światła na granicy ośrodków – kąt Brewstera

Kąt pomiędzy promieniem odbitym i załamanym wynosi $=2\pi$




$$\operatorname{tg}\theta = \frac{n_2}{n_1}$$



Płytko płasko-równoległa

Płytko płasko-równoległa:

- najprostszy element optyczny
- wprowadza przesunięcie promienia światła Δ , bez zmiany kierunku propagacji
- Przesunięcie Δ zależy od współczynnika załamania materiału, z którego jest wykonana płytka
- Dla światła polichromatycznego następuje dodatkowo rozszczepienie światła, spowodowane dyspersją



$$\Delta = d \sin i \left(1 - \frac{\cos i}{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} \right)$$


$$\Delta_1 = d \left(1 - \frac{\cos i}{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} \right)$$

Dla małych i :

$$\Delta_1 \approx d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

Podniesienie obrazu

Płytko płasko-równoległa




z prawa załamania:

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$

$$i \equiv \alpha$$

$$i' \equiv \beta$$

Płytko płasko-równoległa



z prawa załamania:

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$


z „jedynek trygonometrycznej”:

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \sqrt{\frac{n^2}{n^2} - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

$$i \equiv \alpha$$

$$i' \equiv \beta$$

Płytko płasko-równoległa



$$i \equiv \alpha$$

$$i' \equiv \beta$$

z prawa załamania:

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$


z „jedyńki trygonometrycznej”:

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

z trójkątów:

$$\frac{d}{l} = \cos \beta \Rightarrow l = \frac{d}{\cos \beta}$$

Płytko płasko-równoległa



$i \equiv \alpha$
 $i' \equiv \beta$

z prawa załamania:

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$

z „jedyńki trygonometrycznej”:

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$


z trójkątów:

$$\frac{d}{l} = \cos \beta \Rightarrow l = \frac{d}{\cos \beta}$$

$$\frac{\Delta}{l} = \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\Delta = \frac{d}{\cos \beta} (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)$$

Płytko płasko-równoległa



$i \equiv \alpha$
 $i' \equiv \beta$

z prawa załamania:

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$

z „jedyńki trygonometrycznej”:

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

z trójkątów:

$$\frac{d}{l} = \cos \beta \Rightarrow l = \frac{d}{\cos \beta}$$


$$\frac{\Delta}{l} = \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\Delta = \frac{d}{\cos \beta} (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)$$

$$\Delta = d \sin \alpha - \frac{d \cos \alpha \sin \beta}{\cos \beta} = d \sin \alpha - \frac{d \cos \alpha \frac{\sin \alpha}{n}}{\frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} = d \sin \alpha \left(1 - \frac{\cos \alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \right)$$

PRZESUNIĘCIE

Płytko płasko-równoległa



$i \equiv \alpha$
 $i' \equiv \beta$

z prawa załamania:

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$

z „jedyńki trygonometrycznej”:

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

z trójkątów:

$$\frac{d}{l} = \cos \beta \Rightarrow l = \frac{d}{\cos \beta}$$

$$\frac{\Delta}{l} = \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\Delta = \frac{d}{\cos \beta} (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)$$



$$\Delta = d \sin \alpha - \frac{d \cos \alpha \sin \beta}{\cos \beta} = d \sin \alpha - \frac{d \cos \alpha \frac{\sin \alpha}{n}}{\frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} = d \sin \alpha \left(1 - \frac{\cos \alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \right)$$

PRZESUNIĘCIE

$$\frac{\Delta}{\Delta_1} = \sin \alpha \Rightarrow \Delta_1 = \frac{\Delta}{\sin \alpha} \Rightarrow \Delta_1 = d \left(1 - \frac{\cos \alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \right) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$


PODNIESIENIE

Pryzmat



- **Pryzmat** – ośrodek ograniczony dwiema nierównoległymi płaszczyznami.
- **Krawędź łamiąca** – prosta powstała z przecięcia obu płaszczyzn.
- **Kąt łamiący** – kąt między płaszczyznami.

Pryzmat




Odchylenie promienia δ jest najmniejsze, gdy światło biegnie przez pryzmat symetrycznie

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \gamma}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)}$$

Klin – gdy mały kąt łamiący

$$\delta_k = (n - 1)\gamma$$

Pryzmat




z trójkątów:

$$\delta = (\alpha - \beta) + (\alpha_1 - \beta_1)$$

$$\varphi = \beta + \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = \varphi - \beta$$

Pryzmat



z trójkątów:

$$\delta = (\alpha - \beta) + (\alpha_1 - \beta_1)$$


$$\varphi = \beta + \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = \varphi - \beta$$

z prawa Snella:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \Rightarrow \beta = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \right)$$

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \beta_1 \Rightarrow \alpha_1 = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \beta_1 \right)$$

Pryzmat



z trójkątów:

$$\delta = (\alpha - \beta) + (\alpha_1 - \beta_1)$$

$$\varphi = \beta + \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = \varphi - \beta$$


z prawa Snella:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \Rightarrow \beta = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha\right)$$

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \beta_1 \Rightarrow \alpha_1 = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1} \sin \beta_1\right)$$

$$\delta = \left(\alpha - \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha\right) \right) + \left(\arcsin\left(\frac{n_2}{n_1} \sin\left(\varphi - \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha\right)\right)\right) \right) - \left(\varphi - \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha\right) \right)$$

Pryzmat



z trójkątów:

$$\delta = (\alpha - \beta) + (\alpha_1 - \beta_1)$$

$$\varphi = \beta + \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = \varphi - \beta$$


z prawa Snella:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \Rightarrow \beta = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \right)$$

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \beta_1 \Rightarrow \alpha_1 = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \beta_1 \right)$$

$$\delta = \left(\alpha - \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \right) \right) + \left(\arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \left(\varphi - \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \right) \right) \right) \right) - \left(\varphi - \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \right) \right)$$

$$\delta = (\alpha - \varphi) + \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \left(\varphi - \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \right) \right) \right)$$




Przypadek symetryczny:

$$\varphi = 2\beta \Rightarrow \beta = \frac{\varphi}{2}$$

$$\delta_{\min} = (\alpha - \beta) + ([\alpha_1 = \alpha] - [\beta_1 = \beta])$$

$$\delta_{\min} = 2\alpha - 2\beta$$

$$\alpha = \frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}$$



Przypadek symetryczny:

$$\varphi = 2\beta \Rightarrow \beta = \frac{\varphi}{2}$$


$$\delta_{\min} = (\alpha - \beta) + ([\alpha_1 = \alpha] - [\beta_1 = \beta])$$

$$\delta_{\min} = 2\alpha - 2\beta$$

$$\alpha = \frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}$$

$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$



Przypadek symetryczny:

$$\varphi = 2\beta \Rightarrow \beta = \frac{\varphi}{2}$$

$$\delta_{\min} = (\alpha - \beta) + ([\alpha_1 = \alpha] - [\beta_1 = \beta])$$

$$\delta_{\min} = 2\alpha - 2\beta$$

$$\alpha = \frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}$$


$$\sin \alpha = n \sin \beta \Rightarrow n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

Dla klina - φ małe: $\sin \theta \approx \theta$

$$n = \frac{\frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}} = \frac{\delta_{\min} + \varphi}{\varphi} \Rightarrow \delta_{\min} = \varphi(n - 1)$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

Pryzmat



$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

